



Les thuyas tombent comme des mouches !

Les Orgevalais qui ont planté des thuyas pour constituer les haies de leurs jardins ont constaté un inquiétant phénomène : certains d'entre eux brunissent avant de mourir. Ce problème n'est nullement local, aucune région de France n'est épargnée et certains villages des Yvelines ont déjà perdu la majeure partie de leurs thuyas. C'est un insecte, « *le bupreste du thuya* », qui en est la cause. Cela commence généralement par une branche qui brunit, comme si elle avait séché au soleil, puis c'est l'arbuste entier qui est touché, voire la haie entière. Ce coléoptère donne naissance à des petites larves qui se nourrissent dans le bois des branches de thuyas et qui ne peuvent être détruits que pendant les mois d'avril à juillet, juste au moment où ils quittent leur abri pour la période de reproduction.. Ces larves pompent la sève et assèchent la branche avant de la faire mourir. Les premiers signes sont difficiles à déceler, il s'agit de minuscules trous formés par la larve. Ce nouvel insecte a fait son apparition il y a trois ans.

Actuellement, seul un traitement à base « deltaméthrine ». est efficace pour préserver les plans et agir comme un repoussoir. De nombreuses jardinerie des environs commercialisent ce produit. En premier lieu il est impératif de couper les branches mortes et de les brûler.

Si nous ne voulons pas que l'ensemble des haies de thuyas de la commune soit infecté et disparaisse, nous devons tous ensemble traiter ces haies pendant la période de mai à juillet, à raison d'une pulvérisation par mois sur l'ensemble des arbustes. Ce n'est qu'à ce prix que les haies pourront être préservées.